



Filgrastim

(Neupogen®, Nivestim®, Zarzio®)

Per a què s'utilitza

Aquest medicament estimula la producció de cèl·lules blanques (leucòcits), que ajuden a la prevenció d'infeccions durant els tractaments de quimioteràpia.

Forma d'administració

El seu metge li prescriurà la dosi exacta, la freqüència i la durada del tractament. No us administreu més dosis ni amb més freqüència que el que li hagi indicat ell.

Aquest tractament s'administra per via subcutània o endovenosa. El personal d'infermeria, en col·laboració amb altres professionals sanitaris, l'instruirà sobre l'administració correcta del medicament i li facilitarà tota la informació necessària relacionada amb aquest. En aquest cas, assegureu-vos que entén perfectament tots es passos que ha de seguir. Cada xeringa correspon a una dosi de medicament.

Situacions especials

Si oblideu una dosi, consulteu al seu metge o farmacèutic.

Contraindicacions

No utilitzeu aquest medicament si ha presentat anteriorment reacció al·lèrgica al filgrastim o al pegfilgrastim (Neulasta®).

No preneu aquest medicament en les 24 hores prèvies i/o posteriors a l'administració de quimioteràpia o radioteràpia.

Com emmagatzemar i llençar aquest medicament

Conserveu el medicament al frigorífic, no al congelador. Abans d'utilitzar-lo, el podeu deixar a temperatura ambient, però no més de 24 hores fora de la nevera. Mantingueu el medicament fora de l'abast dels nens. Després de la seva utilització, llenceu la xeringa en un contenidor especial d'agulles i xeringues a la farmàcia més propera.

Interaccions

Informe el seu metge de tots els medicaments que està prenent.

Precaucions durant el seu ús

Assegureu-vos que el seu metge n'està al corrent si vostè està embarassada o en període de lactància materna, o bé si pateix anèmia.

Informe el seu metge si és al·lèrgic a la goma o al cautxú, ja que el punt d'inserció de l'agulla amb la xeringa és d'aquest material. Durant el tractament el seu metge li realitzarà anàlisis de sang periòdiques.

Si creu que pot tenir una infecció, amb símptomes com febre, calfreds, cansament o mal de coll, aviseu el seu metge ràpidament.

Efectes adversos

Reaccions al·lèrgiques. Els més freqüents són dolors d'articulacions o musculars, febre, elevació de les transaminases, àcid úric elevat o hipotensió. Si nota qualsevol altre efecte, aviseu el seu metge.

**Si té algun dubte sobre el tractament, consulti el seu metge o farmacèutic.
Llegeixi atentament el prospecte del medicament**

Cuida't, cuida el planeta: recicla els medicaments. És important fer un reciclatge correcte dels medicaments, evitant dipositar guants i mascaretes al Punt SIGRE.



Filgrastim

(Neupogen®, Nivestim®, Zarzio®)

Para qué se utiliza

Este medicamento estimula la producción de células blancas (leucocitos) que ayudan a la prevención de infecciones durante los tratamientos de quimioterapia.

Forma de administración

Su médico le prescribirá la dosis exacta, la frecuencia y la duración del tratamiento. No se administre más dosis ni con más frecuencia que lo indicado por él.

Este medicamento se administra por vía subcutánea o endovenosa. El personal de enfermería, en colaboración con otros profesionales sanitarios, le instruirá sobre la administración correcta del medicamento y le facilitará toda la información necesaria relacionada con el mismo. En este caso asegúrese que entiende perfectamente todos los pasos a seguir. Cada jeringa corresponde a una dosis de medicamento.

Situaciones especiales

Si olvida una dosis consulte a su médico o a su farmacéutico.

Contraindicaciones

No debe utilizar este medicamento cuando haya presentado reacción alérgica al filgrastim o al pegfilgrastim (Neulasta®).

No debe tomar este medicamento en las 24 horas previas y/o posteriores a la administración de quimioterapia o radioterapia.

Cómo almacenar y desechar este medicamento

Conserve el medicamento en la nevera, no en el congelador. Antes de utilizarlo, puede dejar el medicamento a temperatura ambiente pero no más de 24 horas fuera de la nevera. Mantenga el medicamento fuera del alcance de los niños. Después de su utilización deseche la jeringa en un contenedor especial de agujas y jeringas en la farmacia más cercana.

Interacciones

Informe a su médico de todos los medicamentos que está tomando.

Precauciones durante su uso

Asegúrese que su médico está al corriente si está usted embarazada o en periodo de lactancia materna, o bien, si sufre anemia.

Informe a su médico si es alérgico a la goma o al caucho ya que el punto de inserción de la aguja con la jeringa es de dicho material. Durante el tratamiento su médico le realizará análisis de sangre periódicos.

Si piensa que puede tener una infección con síntomas como fiebre, escalofríos, cansancio o dolor de garganta, avise a su médico rápidamente.

Efectos adversos

Reacciones alérgicas. Los más frecuentes son dolores de articulaciones o musculares, fiebre, elevación de transaminasas, ácido úrico elevado o hipotensión. Si nota cualquier otro efecto, avise a su médico.

**Si tiene alguna duda sobre el tratamiento consulte su médico o farmacéutico.
Lea atentamente el prospecto del medicamento.**

**Cuídate, cuida el planeta: recicla los medicamentos. Es importante hacer un
reciclaje correcto de los medicamentos, evitando depositar guantes y mascarillas
en el Punto SIGRE.**

SCIAS - Hospital de Barcelona – Servicio de Farmacia
Diagonal, 660 08034 Barcelona - Tel. **93 254 24 90** www.hospitaldebarcelona.cat