



# Metilergometrina (Methergin® 0,125mg)

## Per a què s'utilitza

La metilergometrina s'utilitza en les hemorràgies després del part o avortament, quan no disminueix la mida de l'úter o apareixen coàguls a l'úter després del part. Provoca la contracció ràpida i contínua de l'úter.

## Forma d'administració

La metilergometrina es pren en forma de comprimits per via oral. El metge li indicarà la dosi i freqüència que haurà de prendre. Recordeu que és molt important la regularitat en aquest tipus de tractament.

## Situacions especials

Si creieu que ha pres més dosi de la indicada, informeu el seu metge. Una dosi massa alta pot provocar nàusees, vòmits, formigueig a les extremitats, dificultat per respirar, convulsions i pèrdua de consciència. No preneu una dosi doble per compensar les dosis oblidades.

## Efectes secundaris

Aviseu el seu metge sempre que presenti algun dels símptomes següents: mal de cap, tensió alta, erupcions a la pell, dolor abdominal, nàusees, vòmits, mareig, sudoració. Si experimenteu qualsevol altre tipus d'efecte advers, consulteu amb el seu metge.

## Precaucions

El suc de pomelo interfereix l'efecte de la metilergometrina.

No s'ha d'administrar en dones embarassades i en període de lactància.

**Atenció:** aquest medicament pot produir somnolència. No conduïu cap tipus de vehicle.

Abans de prendre metilergometrina, informeu el seu metge d'altre medicament que estiguen prenent, amb o sense recepta, o també si patiu malalties del fetge, ronyó, cor o al·lèrgies.

## Bibliografia

1. Drugdex® Micromedex. Methylergometrine. Consultado el 17 de Marzo de 2015

**Si té algun dubte sobre el tractament, consulti el seu metge o farmacèutic.  
Llegeixi atentament el prospecte del medicament**

**Cuida't, cuida el planeta: recicla els medicaments. És important fer un reciclatge correcte dels medicaments, evitant dipositar guants i mascaretes al Punt SIGRE.**

SCIAS - Hospital de Barcelona – Servei de Farmàcia  
Diagonal, 660 08034 Barcelona - Tel. 93 254 24 90 [www.hospitaldebarcelona.cat](http://www.hospitaldebarcelona.cat)



## Metilergometrina (Methergin® 0,125mg)

### Para qué se utiliza

La metilergometrina se utiliza en las hemorragias después del parto o aborto, cuando no disminuye el tamaño del útero o aparecen coágulos en el útero tras el parto. Provoca la contracción rápida y continua del útero.

### Forma de administración

La metilergometrina se toma en forma de comprimidos por vía oral. El médico le indicará la dosis y frecuencia que deberá tomar. Recuerde que es muy importante la regularidad en este tipo de tratamiento.

### Situaciones especiales

Si cree que ha tomado más dosis de la indicada, informe a su médico. Una dosis demasiado alta puede provocar náuseas, vómitos, hormigueo en las extremidades, dificultad para respirar, convulsiones y pérdida de conciencia.

Si olvida tomar una dosis, no tome una dosis doble para compensar.

### Efectos secundarios

Avise a su médico siempre que presente alguno de los síntomas siguientes: dolor de cabeza, tensión alta, erupciones en la piel, dolor abdominal, náuseas, vómitos, mareos, sudoración. Si experimenta cualquier otro tipo de efecto adverso, consulte con su médico.

### Precauciones

El zumo de pomelo interfiere el efecto de metilergometrina.

No debe administrarse en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

**Atención:** este medicamento puede producir somnolencia. No conduzca ningún tipo de vehículo.

Antes de tomar la metilergometrina, informe a su médico de otros medicamentos que esté tomando con o sin receta, o también si padece enfermedades del hígado, riñón, corazón o alergias.

### Bibliografía

1. Drugdex® Micromedex. Methylergometrine. Consultado el 17 de Marzo de 2015

**Si tiene alguna duda sobre el tratamiento consulte su médico o farmacéutico.  
Lea atentamente el prospecto del medicamento.**

**Cuídate, cuida el planeta: recicla los medicamentos. Es importante hacer un reciclaje correcto de los medicamentos, evitando depositar guantes y mascarillas en el Punto SIGRE.**

SCIAS - Hospital de Barcelona – Servicio de Farmacia  
Diagonal, 660 08034 Barcelona - Tel. 93 254 24 90 [www.hospitaldebarcelona.cat](http://www.hospitaldebarcelona.cat)